服用薄血丸人士的喜訊

一滴血・一分鐘

自我監測減風險

薄血丸能夠令身體血液凝固的功能減低，延長凝血時間，但服用不當或劑量過多卻會出現內出血，而用量太少則可能會有血塊形成的危險。所以正在服用薄血丸的人士，應該定期接受血凝固測試，檢查血凝固狀態 (INR) ，確保維持安全藥效。此外，定期自我監測 INR ，更有助減低服食薄血丸的風險[1]。

羅氏「康固全」血凝機採用全新電子化學探測系統，試紙更備有自動質量監控，提供監測的可靠性。用家遍及全球，包括醫院、心臟科專科醫生、家庭科醫生以及服食薄血丸的人士。



CoaguChek®
Because it's my life

簡易的測試步驟

1. 置入新試紙，血凝機即自動開啟。

2. 用採血筆於指尖採血。

3. 把血滴緊貼試紙上透明窗口的邊緣，血液便會自動滲入。

4. 測試結果將於1分鐘內顯示於屏幕上。

[1] B. Menéndez-Jándula et al., Ann Intern Med. 2005

Roche

羅氏診斷(香港)有限公司
葵涌興芳路223號
新都會廣場一座17樓
總機：2481 3387

「康固全」熱線：**9534 6020**
www.coaguchek.com
hongkong.coaguchek@roche.com